

5

Spočítejte intenzitu elektrického pole dvou opačně homogenně nabitých rovin pomocí Gaussova zákona. Výsledek použijte k přibližnému výpočtu kapacity deskového kondenzátoru.

Gaussov zákon elektrostatiky v integrálním tvaru

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon}$$

(obecně pro prostředí s permitivitou  $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$ )

Nejdříve spočítáme intenzitu elektrického pole jedné roviny. Výsledné pole pak dostaneme superpozicí elektrických polí dvou takových rovin.

A


intenzita elektrického pole jedné roviny

Velikost vektoru  $\vec{E}$  určíme pomocí Gaussova zákona

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Gaussov  
váleček

neboť rovina je umístěna ve vakuu. Gaussovou plochu zvolíme jako váleček kolmý na nabítou rovinu s podstavami symetricky rozmístěnými na dvou stranách.



Vzhledem k symetrii úlohy musí být vektor intenzity elektrického pole  $\vec{E}$  kolmý na tuto rovinu. Kdyby nebyl, pak otočení nábité roviny kolem osy kolmé k rovině průřezu by uvažovaným bodem A způsobilo změnu výsledného elektrického pole a jeho intenzity  $\vec{E}$ . Otočení nábité roviny kolem osy kolmé k rovině však nezpůsobí změnu intenzity  $\vec{E}$ , a proto  $\vec{E}$  je kolmý na tuto rovinu.

Ze symetrie úlohy také vyplývá, že velikost intenzity elektrického pole může záviset pouze na vzdálenosti uvažovaného bodu A od nábité roviny.

Tok vektorů  $\vec{E}$  přes plošný Gaussův váleček je zřejmě nulový, protože vektor  $\vec{E}$  je kolmý k normále plošného Gaussova válečku

$$(\vec{E} \perp d\vec{S} \Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0).$$

Dostáváme tedy

$$\int E(x) \cdot dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

podle toho  
Gaussova váleček

$$E(x) \cdot \cancel{S_{pd}} \cdot 2 = \frac{\sigma \cdot \cancel{S_{pd}}}{\epsilon_0}$$

$$E(x) = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \quad \dots \text{nezávisí na } x\text{-ové souřadnici}$$

$$E = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0}$$

Homogenně nabitá rovina vytváří homogenní elektrické pole, ~~neboť jeho~~  
 intenzita nezávisí na vzdálenosti od roviny. V případě  $\sigma > 0$   
 má vektor intenzity  $\vec{E}$  od nabitě roviny, v opačném případě  
 směrem k ní.




B) intenzita elektrického pole dvou opačně nabitých rovin

V případě opačně nabitých rovin se oba příspěvky vektorové  
 sčítají. Výsledné pole je pak nulové pouze mezi  
 oběma rovinami a má veličnost

$$E = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} + \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Určení směru intenzity elektrického pole jedné roviny

$$\int_{2 \cdot s_{pd}} \vec{E}(x) \cdot d\vec{s} = \frac{\sigma \cdot s_{pd}}{\epsilon_0}$$



$$\vec{E}(x) \cdot d\vec{s} = |\vec{E}(x)| \cdot |d\vec{s}| \cdot \cos \varphi$$

Protože  $\vec{E} \parallel d\vec{s}$  a mají stejný směr, pak platí  $\varphi = 0$

a tedy  $\cos \varphi = 1$ . Můžeme tedy psát

$$\vec{E}(x) \cdot d\vec{s} = E \cdot ds \cdot 1 = E \cdot ds$$

$$E(x) \cdot s_{pd} \cdot 2 = \frac{\sigma \cdot s_{pd}}{\epsilon_0}$$


$$E(x) = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0}$$

Pro  $\sigma > 0$  platí  $E(x) > 0$  ... tj.  $\vec{E}$  směřuje od roviny.

Pro  $\sigma < 0$  platí  $E(x) < 0$  ... tj.  $\vec{E}$  směřuje opačně než je  
nahruleno na obrázku, tj.  
 $\vec{E}$  směřuje k rovině.

přičemž můžeme od kladně nabitých roviny směrem k záporně nabitě.

Vně obou rovin se pole vzájemně ruší.




c) přibližný výpočet kapacity deskového kondenzátoru

V případě deskového kondenzátoru můžeme předpokládat,

zanedbáme-li tzv. okrajové vlivy, že elektrické pole mezi deskami

má stejný charakter jako pole mezi opačně nabitými rovinami.



Kapacitou kondenzátoru se rozumí poměr mezi nábojem  $Q$

na kondenzátoru a příslušným napětím  $U$ , tedy

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma \cdot S}{U}$$

V homogenním poli platí pro napětí vztah  $E = \frac{U}{d}$ , neboli:

$$U = E \cdot d$$

Můžeme proto dále psát kapacita deskového kondenzátoru

$$C = \frac{\sigma \cdot S}{E \cdot d} = \frac{\cancel{\sigma} \cdot S}{\frac{\cancel{\sigma}}{\epsilon_0} \cdot d} = \frac{\epsilon_0 \cdot S}{d}$$

Zdeněk Veselý - teoretické cvičení z FYA2